

26 janvier 2010
Société médecine
travail

Question n° 1

L'âge >50 ans chez les ♂ et >60 ans chez les ♀ est un des facteurs de risque utilisés pour estimer le risque cardiovasculaire global

Question n° 2

Le traitement de l'angor stable comprend le traitement médical et parfois une revascularisation

Question n° 3

Une augmentation de la troponine est spécifique de l'IDM

Question n° 4

Après un angor stable avec revascularisation, la reprise du travail peut se faire au bout d'un mois si le poste de travail est sédentaire

Question n° 5

Après un syndrome coronarien aigu, une épreuve d'effort avec une FE > 70% est un élément rassurant et permettant une reprise d'activité avant 3 mois.

Question n° 6

Le coût cardiaque relatif CCR est utilisé dans toutes les grilles de pénibilité

Question n° 7

Les nouveaux embauchés au poste étudié sont exclus d'une étude de cardiofréquencemétrie

Question n° 8

La cardiofréquencemétrie peut aider à la définition de l'aptitude

Question n° 9

Le traitement des données de
cardiofréquencemétrie se fait grâce à un
logiciel spécifique

Question n° 10

La fréquence cardiaque de référence FC moyenne avant travail correspond à la FC moyenne des 5 dernières minutes de 10 mn assis.

DEPARTEMENT DE FORMATION MEDICALE CONTINUE FACULTE DE MEDECINE DE MARSEILLE



- Livret
- Les Mercredis des Généralistes
- Attestation d'Etudes
- Dossiers
- Cours
- News



- Présentation
- Règlementation
- Liens
- Outils
- Liste de diffusion
- Plan du site
- Code d'accès

27 bd Jean Moulin - 13385 Marseille Cedex 5
Tél. : 04 91 32 45 74 ou 04 91 32 45 75 - Fax : 04 91 32 45 76
Email : fmc-secretariat@medecine.univ-mrs.fr

© 1998 - 2003 - fmc-marseille.com - Tous droits réservés

Conception & Réalisation @nsweb

<http://www.fmc-marseille.com>